


Descrição:

SAIstab®CA pode ser usado para o tratamento de vinhos com elevado teor de cálcio, devido ao seu mecanismo de ação que consiste na troca cálcio-potássio. Após o tratamento com **SAIstab®CA**, o vinho deve ser sujeito a frio para ocorrer a precipitação do potássio adicionado.

Embora a precipitação de cálcio seja beneficiada por valores de pH altos, o **SAIstab®CA** consegue obter excelentes resultados em vinhos com pH baixo ou com cálcio altamente complexado.

Além disso, o **SAIstab®CA** também tem bons resultados em vinhos armazenados a temperaturas baixas e com alto teor de álcool.



Embalagens:

SAIstab®CA está disponível em embalagens de 1kg.

Segurança Alimentar:

Produto isento de OGM.

Produto isento de alergénios de acordo com o Anexo II do Regulamento (UE) N°1169/2011.

Produto em conformidade com o Códex Enológico e o Regulamento Delegado (UE) n° 934/2019.

Produto não sujeito a radiação ionizante.

Nanomateriais - não foi produzido com recurso a nanotecnologia, não contendo nanomateriais, de acordo com o Regulamento (UE) n° 1169/2011.

Composição:

Tartarato de potássio neutro na forma racémica.

Aplicação:

Dissolver o **SAIstab®CA** em água, numa proporção de 1:5.

Adicionar ao vinho previamente clarificado e sem adição de coloides por remontagem (à temperatura ambiente), garantindo boa homogeneização.

Realizar duas remontagens por dia durante 2 a 3 dias, após esse tempo, colocar o vinho no frio. Nesta fase, deve ser adicionado **SAIstab®KHT** para ajudar à precipitação total do tartarato de potássio racémico previamente adicionado.

Nota importante: O vinho deve estar clarificado e filtrado e sem aditivos aquando o tratamento para evitar fenómenos físico-químicos indesejáveis.

Dosagem:

A dose de aplicação de **SAIstab®CA** deve ser 5 vezes superior à dose de cálcio que se pretende reduzir.

Por exemplo, para reduzir 100 mg/L de cálcio é necessário adicionar 500 mg/L de **SAIstab®CA**. A adição de 100 mg de **SAIstab®CA** resulta em um aumento de 33 mg de potássio.

Nota importante: **SAIstab®CA** deve ser usado para baixar no mínimo 25 mg/L de cálcio, para reduções inferiores não é recomendável a sua utilização.

Armazenamento:

Manter em local fresco e seco, longe de fontes de calor.